



**Leporidae:**

Familia del orden de los Lagomorfos. Compuesta por dos géneros y cuatro especies. Caracterizados por sus grandes y largas orejas, hocico corto y cubierto de vello, ojos grandes situados a ambos lados de la cabeza, cola corta, extremidades posteriores robustas y mas largas que las anteriores, cinco dedos y dos pares de dientes incisivos superiores (característica común en todo el orden de los Lagomorfos).



*Lepus granatensis*

**1.- (1a)** De pequeño tamaño, con la cabeza redondeada, orejas de color uniforme de menor longitud que la cabeza y con las puntas redondeadas. .... ***Oryctolagus cuniculus*** (Linnaeus 1758)



Foto 1: *Oryctolagus cuniculus*. Se aprecia el tamaño de las orejas, algo menor que la longitud de la cabeza




Foto 2: *Oryctolagus cuniculus*. Se ve claramente la forma redondeada de la punta de las orejas.

**(1b)** Mayor tamaño que el genero *Oryctolagus*. Cabeza más esbelta y orejas más largas que la cabeza, con el borde superior de color negro y forma puntiaguda. .... ***Lepus*** (Linnaeus 1758)



Foto 3: *Lepus*. Se aprecia con claridad la mayor longitud de las orejas con respecto a la cabeza



Foto 4: *Lepus*. Extremidades dotadas para la carrera.



## Familia Leporidae Clave de especies

Ref: Mam.1  
(08/07/15)



2.- (2a) Es la de menor tamaño de las tres especies ibéricas. Presenta mancha ventral blanca ampliamente extendida ocupando pecho, vientre y parte superior de las patas delanteras .....**Lepus granatensis** Rosenhauer 1856



Foto 5: *Lepus granatensis* (Liebre ibérica). Distribuida por toda la península, se aprecia claramente la amplia zona ventral blanca.

(2b) Es la de mayor tamaño de las tres. Las manchas ventrales blancas prácticamente resultan inexistentes .....  
.....**Lepus europaeus** Pallas 1778



Foto 6: *Lepus erupaeus* (liebre europea). Se encuentra distribuida por toda la Cordillera Cantábrica, Pirineos, País Vasco, Burgos, Asturias y Palencia.



**Familia Leporidae**  
**Clave de especies**

Ref: Mam.1  
(08/07/15)



(2c) De tamaño intermedio, la zona ventral blanca no se encuentra tan ampliamente distribuida, estando ausente en la parte superior de las patas delanteras ..... **Lepus castroviejoi** Palacios 1977



Foto 7: *Lepus castroviejoi* (Liebre de piornal). Es un endemismo ibérico cuyo habitat se encuentra restringido a las zonas altas de la cordillera Cantábrica. En la foto se puede apreciar la ausencia de la mancha blanca en la parte superior de las patas delanteras.

**AGRADECIMIENTOS:**

Coordinación: Nacho Cabellos Cano  
Claves y textos: José Pascual González  
Revisión: Jorge Falagán Fernández y Nacho Noval Fonseca  
Maquetación: Antonio Pedreira Ríos  
Fotos: Jaime Bernáldez Bernáldez (Foto 4)  
Jordi Clavell Corbera (Foto 6)  
Jordi Dalmau Caner (Foto 2)  
José Ignacio García-Abasolo González (Fotos: Introducción, 1 y 2)  
Esmeralda Ramos-García Nieto (Foto 5)  
Antonio Rodríguez Arduengo (Foto 7)