

***Ceriana*:**

Género de la familia Syrphidae caracterizado por tener situadas las antenas sobre una larga proyección de la frente, y por el peculiar pico que forma la vena R4+5. Son grandes imitadores de las avispas. Siempre se encuentran próximos a árboles maduros. En Europa están descritas dos especies, ambas presentes en la Península Ibérica.



Ceriana conopsoides

- 1.- **(1a)** Escutelo amarillo. Parte anterior del tórax con una banda amarilla. Es la especie más pequeña de las dos, de ocho a diez milímetros..... ***Ceriana vespiformis*** (Latreille, 1804)



Foto 1: *Ceriana vespiformis*. Se señalan el escutelo amarillo (a) y la banda amarilla de la parte anterior del tórax (b). Asimismo se indica el pico de R4+5 (c), característico del género.




Foto 2: *Ceriana vespiformis*. Igualmente, se señalan el escutelo amarillo (a) y la banda amarilla de la parte anterior del tórax (b).

- (1b)** Escutelo bicolor (parte anterior amarilla, parte posterior negra). Parte anterior del tórax negra con manchas amarillas. Especie más grande (11-14 mm)..... ***Ceriana conopsoides*** (Linnaeus, 1758)




Foto 3: *Ceriana conopsoides*. Se señalan el escutelo bicolor amarillo y negro (a) y las manchas de la parte anterior del tórax (b), mientras que (c) indica el pico de la vena R4+5, propio de *Ceriana*.



Foto 4: *Ceriana conopsoides*. Se señalan, igualmente, el escutelo bicolor amarillo y negro (a) y las manchas de la parte anterior del tórax (b). También se muestra el pico de la vena R4+5, común a todas las especies del género.

AGRADECIMIENTOS:

Coordinación:	Nacho Cabellos Cano y José Ángel López Muñoz
Claves y textos:	Piluca Álvarez Fidalgo
Revisiones:	Nacho Noval Fonseca
Maquetación:	Antonio Pedreira Ríos y Nacho Cabellos Cano
Dicciotaxo:	Nacho Cabellos Cano
Fotos:	Marián Álvarez Fidalgo (Foto 3) Piluca Álvarez Fidalgo (Foto Introducción) José Ignacio Pascual (Fotos 2 y 4) Antonio Robledo Miras (Foto 1)