

Cercopidae:

Familia de hemípteros perteneciente al suborden Cicadomorpha. Se caracteriza por su coloración aposemática, que combina diferentes diseños con manchas de colores rojos y negros. Su tamaño aproximado va de los 7'5 a los 10'5 mm dependiendo de la especie y el sexo. Las ninfas se encuentran en las raíces de las plantas, envueltas por masas de espuma.

En la Península se citan únicamente dos géneros: *Cercopis* y *Haematoloma*, este último representado por una sola especie (*Haematoloma dorsata*).



Cercopis intermedia

1.- (1a) Margen de las alas anteriores de color negro..... *Cercopis* Fabricius, 1775



Foto 1: *Cercopis vulnerata*. Se señalan los márgenes negros de las alas.



Foto 2: *Cercopis vulnerata*. Se muestra el margen negro del ala.

(1b) Margen de las alas anteriores de color rojo..... *Haematoloma* Haupt, 1919
(Una sólo especie, *H. Dorsata* (Ahrens, 1812))




Foto 3: *Haematoloma dorsata*. Se señalan los márgenes rojos de las alas.



Foto 4: *Haematoloma dorsata*. Se indica el margen rojo del ala.

AGRADECIMIENTOS:

Coordinación:	Nacho Cabellos Cano y Jose A. López Muñoz
Claves y textos:	Ángel Umaran del Campo
Maquetación:	Antonio Pedreira Ríos
Revisiones:	Nacho Noval Fonseca
Dicciotaxo:	Nacho Cabellos Cano
Fotos:	Carlos Castañeda Navarro (Foto 4) Valter Jacinto Jacinto (Introducción y foto 3) Manuel López Rodríguez (Foto 2) Ferrán Turmo Gort (Foto 1)